

MENOFEM ®

Co obsahuje Váš lék?

1 potahovaná tableta obsahuje: Cimicifugae extractum siccum (7-12:1) 1,66-2,86 mg (odp. 20 mg oddenku ploštičniku).

Další látky obsažené v léku

Monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mastek, oxid titaničitý, žlutý a červený oxid železitý, makrogol 6000, disperze methakrylátového kopolymeru RL 30%.

Indikační skupina: Fytofarmaka, gynekologika.

Charakteristika:

Suchý vodně alkoholový výtazek z oddenků ploštičniku obsahující mimo jiné estrogenoidní (ženským pohlavním hormonům - estrogenům - podobné) látky. Tyto látky snižují sekreci luteinizačního hormonu, který je vylučován z předního laloku podvěsku mozkového. Je známo, že vyšší hladiny luteinizačního hormonu vyvolávají návaly horka. Sérové hladiny ostatních hormonů, tj. FSH (folikuly stimulujícího hormonu) a prolaktinu, nebývají ovlivněny.

Kdy se lék používá?

Menofem se užívá ke zmírnění lehkých až středně těžkých neurovegetativních potíží provázejících období klimakteria (přechodu) jako návaly horka, pocení, nervozita, podrážděnost, depresivní rozlady, poruchy spánku, poruchy soustředění. Přípravek je určen pro ženy.

Kontraindikace:

Přecitlivělost na některou složku přípravku. Tablety nejsou určeny dětem do 6 let, kapky kojencům a dětem mladším než 1 rok.

Kdy byste neměli lék užívat

Menofem se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku, v průběhu těhotenství a kojení. Menofem by neměly užívat pacientky s dřívějším nebo současným zhoubným nádorem prsu nebo dělohy. V těchto případech se poradte s lékařem.

Nežádoucí účinky:

Přípravek bývá při obvyklém dávkování dobře snášen, avšak příležitostně se mohou vyskytnout zažívací (žaludeční) potíže - pocity plnosti, nucení ke zvracení, zřídka dochází ke krvácení z pohlavních orgánů mimo menstruační cyklus a bolesti prsou. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušete užívání a poradte se s lékařem.

Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu?

Interakce nejsou popisovány. Lékaře však vždy upozorněte na všechny léčivé přípravky, které užíváte (včetně volně prodejných).

Těhotenství a kojení: Lékaře vždy informujte o případném těhotenství nebo kojení.

Dávkování:

 Obvyklé dávkování

1 potahovaná tableta 2krát denně (ráno a večer). Doporučená doba léčby je nejméně 8 týdnů.

Po nejméně 6 měsících podávání přípravku je nezbytná gynekologická kontrola.

Použití: Tablety se užívají celé, nerozkousané a zapíjejí se malým množstvím tekutiny.

Upozornění: V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávání: Uchovávat v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vzdušnou vlhkostí, při teplotě do 25 st. C. Chraňte před mrazem.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

30, 3 x 30, 60 potahovaných tablet.

Výrobce:

BIONORICA AG

Kerschensteinerstrasse 11 - 15

D - 92308 Neumarkt

Spolková republika Německo