

CICADERMA

100g masti obsahuje:

Extractum herbarum vaselinum pro Cicaderma - 97,0 g

Ledum palustre – tinctura basica a.u.h. - 1,5 g

Pulsatilla vulgaris – tinctura basica a.u.h. - 1,5 g

Složení extraktu:

Calendulae herba recens - 20 g

Hyperici herba recens - 10 g

Millefolii herba recens - 10 g

Vaselinum album - 100 g

Popis přípravku:

homogenní mast konzistence vazelíny, barvy žlutozelené až žlutooranžové, specifického aromatického zápachu.

Indikace:

Pomocný přípravek při léčbě drobných popálenin kůže a drobných čistých povrchových poranění, např. malé vyčištěné odřeniny, drobné řezné rány, praskliny kůže, bodnutí hmyzem apod.

Dávkování a způsob podání:

Po vyčištění poranění se nanáší na postižené místo 1-2x denně tenká vrstva masti až po několik dnů. Obvazem (event. náplastí s polštářkem) kryjeme postižené místo vždy, pokud by po nanesení masti bylo vystaveno přímému slunečnímu záření, jinak obvykle jen v případech poněkud většího povrchu poškození, event. na místech vystavených tření, bezprostřednímu kontaktu při práci apod.

Kontraindikace:

Přecitlivělost na některou složku přípravku. Přípravek není určen dětem do 3 let.

Speciální upozornění:

Z důvodu možné fotosenzibilizace nevystavovat místa ošetřená mastí přímému slunečnímu záření. Okluzivní charakter vehikula může vyvolat superinfekci; ujistěte se o asepsi poranění.

Interakce

Nejsou dosud známy.

Těhotenství a laktace:

Užití přípravku je bez rizika. Při kojení nenanášet na prsy a na bradavky.

Možnost ovlivnění pozornosti nepravděpodobná.

Nežádoucí účinky:

Třezalka (*Hypericum perforatum* L.) může vyvolávat zejména u osob se světlou pokožkou fotosenzibilizační reakci.

Uchovávání:

V suchu, při teplotě 15-25°C, chránit před světlem.

Velikost balení: 30 g.

