

Engystol

Tablety

Engystol obsahuje:

Vincetoxicum hirundinaria D6

Vincetoxicum hirundinaria D10

Vincetoxicum hirundinaria D30

Sulfur D4

Sulfur D10

Pomocnými látkami jsou: magnesium stearát, monohydrát laktosy.

1. Kombinovaný přípravek **Engystol** je homeopatická specialita.
2. Neužívejte přípravek **Engystol**, jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
3. Zvláštní opatření při použití přípravku Engystol je zapotřebí, jestliže trpíte poruchou funkce štítné žlázy se sníženou tolerancí jódu. V tomto případě užití přípravku Engystol konzultujte se svým lékařem.
4. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
5. Těhotenství a kojení. Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
6. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů - Bez omezení.

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento homeopatický přípravek užívat.

Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x1 tableta 15-20 minut před jídlem nechat rozpustit pod jazykem. Při akutních potížích 1 tableta každých 15 minut po dobu 2 hodin. V případě preventivního použití 2x1 tableta po dobu 4-6 týdnů.

Pro vyčerpávající informace se obraťte na odborníky v homeopatii, lékaře a lékárníky nebo na naši

informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY - Nejsou známy.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Dr. Peithner Prag s.r.o.

Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4