

Mastodynon®

Kapky k vnitřnímu užití.

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci:

BIONORICA AG

D - 92308 Neumarkt, Německo

Složení:

100 g kapek obsahuje:

Účinné složky:

Agnus castus D 1 20,0 g, Caulophyllum thalictroides D 4 10,0 g, Cyclamen europaeum D 4 10,0 g, Strychnos ignatii D 6 10,0 g, Iris versicolor D 2 20,0 g, Lilium tigrinum D 3 10,0 g.

Pomocné látky:

alkohol 53 objemových %. 1,0 ml = 0,93 g. 1,0 ml = 0,45 g alkoholu. 1,0 ml = 27 kapek.

Indikační skupina:

Fytofarmakum. Gynekologikum.

Charakteristika:

Kombinace rostlinných matečných tinktur v různém stupni decimálního ředění, z nichž především látky z Agnus castus (plodů drmku obecného) působí experimentálně prokázaným dopaminergním mechanismem (D2) na laktotropní buňky předního laloku hypofýzy, čímž snižují uvolňování prolaktinu. Přípravek je určen pro ženy ve fertilním (plodném) věku.

Indikace:

Přípravek se používá při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvence krvácení), při premenstruačním syndromu, tj. krátce před menstruačním krvácením výskyt pocitu napětí nebo bolestivosti prsů (mastodynie), spojené často s psychickou nevyrovnaností až depresivní náladou, bolestmi hlavy migrenózního typu, event. otoky v oblasti obličeje, rukou a nohou, při fibrocystické mastopatii (nezhoubné bolestivé onemocnění prsů). Před započítím léčby je u menstruačních poruch a pocitech bolestivosti, tlaku nebo napínání v prsech vždy nezbytné odborné diagnostické ověření příčiny obtíží a vyloučení jiných, závažnějších příčin.

Kontraindikace:

Eventuální přecitlivělost na některou ze složek přípravku.

Nežádoucí účinky:

Ojedinele se může vyskytnout nevolnost, žaludeční potíže, mírný vzestup hmotnosti, svědivá vyrážka, akné nebo bolest hlavy. Při užívání léků obsahujících extrakt z Agnus castus se může objevit přechodný psychický a tělesný neklid, stavy zmatenosti a halucinace. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Interakce:

Současné užívání hormonálních přípravků (gestagenů) může ovlivnit (snížit) účinek přípravku.

Upozornění:

Vzhledem k obsahu cca 53% (obj.) alkoholu přípravek není vhodný pro epileptiky a pacientky léčené dříve nebo v současnosti pro alkoholismus. V případě onemocnění jater se o užití přípravku poraďte s lékařem.

Zvláštní upozornění:

Přípravek se nepoužívá při zhoubných onemocněních prsu.

Dávkování a způsob použití:

Nepředepíše-li lékař jinak, obvykle se užívá: 2x denně (ráno a večer) vždy 30 kapek. Kapky se nakapou do malého množství vody a vypijí. Lahvičku při odměřování kapek držte svisle! Užívání nemá být přerušováno (ani během menstruace). Zlepšení obtíží nastává zpravidla po 6 týdnech, léčba má trvat po dobu nejméně 3 měsíců. Pokud se po ukončení léčby obtíže opět objeví, lze podle výsledku kontroly gynekologem v léčbě případně pokračovat.

Uchovávání:

Přípravek uchovávejte za obvyčné teploty, chraňte před světlem.

Varování:

Přípravek je nutno uchovávat mimo dosah dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení:

50 ml